

Quaternions et rotations

Yves Coudene 09/03

J'explique brièvement comment employer les quaternions pour étudier les rotations de \mathbf{R}^3 . Les démonstrations sont laissées en exercice.

1 Quaternions

Soit $\mathbf{C} = \mathbf{R} + i'\mathbf{R}$ l'ensemble des nombres complexes. On considère les matrices de $M_2(\mathbf{C})$ suivantes, appelées matrices de Pauli :

$$1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i' \\ i' & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Ces matrices obéissent aux règles de commutation suivantes :

$$\forall i, j, \quad \sigma_i \sigma_j = -\sigma_j \sigma_i \quad \text{si } i \neq j; \quad \forall i, \quad \sigma_i^2 = 1.$$

Théorème :

Les matrices $1, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_1\sigma_2, \sigma_2\sigma_3, \sigma_3\sigma_1, \sigma_1\sigma_2\sigma_3$ forment une base de l'ensemble des matrices 2×2 à coefficients complexes, $M_2(\mathbf{C})$.

L'algèbre $M_2(\mathbf{C})$ se décompose donc en :

- un espace vectoriel de dimension 3, $\mathbf{E} = Vect(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$; Un vecteur $\vec{a} \in \mathbf{E}$ s'écrit $\vec{a} = a_1\sigma_1 + a_2\sigma_2 + a_3\sigma_3$;
- une sous-algèbre de dimension 4, $\mathbf{H} = Vect(1, \sigma_1\sigma_2, \sigma_2\sigma_3, \sigma_3\sigma_1)$;
- un sous-espace de dimension 1 engendré par $\sigma_1\sigma_2\sigma_3$.

On pose $i = \sigma_1\sigma_2\sigma_3 = i' \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. On a bien $i^2 = -1$. On a également : $\sigma_1\sigma_2 = i\sigma_3, \sigma_2\sigma_3 = i\sigma_1, \sigma_3\sigma_1 = i\sigma_2$. Attention : $i \notin \mathbf{H}$.

Par conséquent, tout élément de \mathbf{H} peut se mettre sous la forme :

$$q = \alpha + i \vec{a}, \quad \alpha \in \mathbf{R}, \quad \vec{a} \in \mathbf{E}.$$

La loi de composition induite sur \mathbf{H} par le produit matriciel peut se réécrire :

$$(\alpha + i \vec{a})(\alpha' + i \vec{a}') = \alpha\alpha' + i(\alpha \vec{a}' + \alpha' \vec{a}) - \vec{a} \vec{a}'$$

$$\text{avec } \vec{a} \vec{a}' = \vec{a} \cdot \vec{a}' + i \vec{a} \times \vec{a}', \quad | \quad \text{prod.scalar, } \times \text{ prod.vectoriel.}$$

Remarques : i commute avec les vecteurs de \mathbf{E} . Le produit de deux vecteurs de \mathbf{E} donne un élément de \mathbf{H} . Enfin le carré d'un vecteur est égal au carré de sa norme.

On pose : $\bar{q} = \alpha - i \vec{a}$ et on vérifie la formule : $q\bar{q} = \alpha^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$. Tout élément non nul de \mathbf{H} est donc inversible. Le corps \mathbf{H} est appelé corps des quaternions. Il vient d'être construit comme sous-algèbre de $M_2(\mathbf{C})$.

2 Rotations

La construction précédente peut être utilisée pour étudier les rotations de \mathbf{R}^3 .

Pour cela, on remarque que l'exponentielle de matrices se restreint aux quaternions :

$$e^{i \vec{a}} = 1 + i \vec{a} - 1/2 \|\vec{a}\|^2 + \dots = \cos \|\vec{a}\| + i \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|} \sin \|\vec{a}\|.$$

en posant $\|\vec{a}\|^2 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$, pour $\vec{a} \in \mathbf{E}$. En particulier le quaternion $e^{i \vec{a}}$ est de norme 1.

Théorème:

Soit $\vec{a} \in \mathbf{E}$ un vecteur unitaire et θ un nombre réel. La rotation d'axe dirigé par \vec{a} et d'angle θ est donnée par :

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &\rightarrow \mathbf{E} \\ \vec{x} &\rightarrow e^{-\frac{1}{2}i \theta \vec{a}} \vec{x} e^{\frac{1}{2}i \theta \vec{a}} \end{aligned}$$

Ceci se vérifie en décomposant \vec{x} selon un vecteur proportionnel à \vec{a} et un vecteur orthogonal à \vec{a} . Un calcul direct redonne l'expression classique des rotations :

$$e^{-\frac{1}{2}i \theta \vec{a}} \vec{x} e^{\frac{1}{2}i \theta \vec{a}} = \cos \theta \vec{x} + (1 - \cos \theta)(\vec{x} | \vec{a}) \vec{a} + \vec{a} \times \vec{x} \sin \theta.$$

De là, il est facile de composer les rotations. On obtient, par exemple, une expression pour le cosinus de l'angle ω de la rotation composée d'une rotation d'angle θ d'axe \vec{a} suivie d'une rotation d'angle ϕ d'axe \vec{b} :

$$e^{-\frac{1}{2}i \omega \vec{u}} = e^{-\frac{1}{2}i \phi \vec{b}} e^{-\frac{1}{2}i \theta \vec{a}}$$

$$\begin{aligned} e^{-\frac{1}{2}i \omega \vec{u}} &= \cos(\omega/2) - i \vec{u} \sin(\omega/2) \\ e^{-\frac{1}{2}i \phi \vec{b}} e^{-\frac{1}{2}i \theta \vec{a}} &= (\cos(\phi/2) - i \vec{b} \sin(\phi/2)) (\cos(\theta/2) - i \vec{a} \sin(\theta/2)) \\ &= \cos(\phi/2) \cos(\theta/2) - \vec{a} | \vec{b} \sin(\phi/2) \sin(\theta/2) \dots \\ &\dots - i (\vec{b} \sin(\phi/2) \cos(\theta/2) + \vec{a} \cos(\phi/2) \sin(\theta/2) + \vec{b} \times \vec{a} \sin(\phi/2) \sin(\theta/2)). \end{aligned}$$

Donc

$$\cos \frac{1}{2} \omega = \cos \frac{1}{2} \phi \cos \frac{1}{2} \theta - (\vec{a} | \vec{b}) \sin \frac{1}{2} \phi \sin \frac{1}{2} \theta.$$

Exercices :

- Montrez que le groupe des quaternions de norme 1 s'identifie à $SU_2(\mathbf{C})$.
- Expliquez le morphisme de $SU_2(\mathbf{C})$ dans $SO_3(\mathbf{R})$ donné par le théorème plus haut. Quel est son noyau ?
- Démontrez l'égalité : $(\vec{x} \times \vec{y}) \times \vec{z} = (\vec{z} | \vec{x}) \vec{y} - (\vec{z} | \vec{y}) \vec{x}$ par un calcul direct avec les quaternions.
- Soit \vec{u} un vecteur unitaire. A quoi correspond la transformation de \mathbf{E} donnée par $\vec{x} \mapsto -\vec{u} \vec{x} \vec{u}$?
- Montrez que l'application $\vec{a} \mapsto e^{i \vec{a}}$, définie de \mathbf{E} dans l'ensemble des quaternions de norme 1, est surjective. Est-ce un morphisme ?

Référence : G. Casanova, *Que-sais-je ?* 1657 "L'algèbre vectorielle".