

## Anneaux, arithmétique

---

### Anneaux

---

**Exercice 1.** Soit  $A$  un anneau commutatif unitaire. On dit que  $x \in A$  est nilpotent s'il existe un entier  $n > 0$  tel que  $x^n = 0$ .

1. Montrer que l'ensemble  $\mathcal{N}$  des éléments nilpotents de  $A$  est un idéal de  $A$ .
2. Montrer que si  $x \in A$  est nilpotent, alors  $1 - x$  est inversible.
3. Montrer que le quotient  $A/\mathcal{N}$  n'a pas d'élément nilpotent non nul.
4. Trouver un exemple d'anneau  $A$  avec deux éléments  $x$  et  $y$  nilpotents tels que  $x + y$  n'est pas nilpotent.
5. Montrer que  $A$  n'a pas d'élément nilpotent non nul si et seulement si tout élément inversible de  $A[X]$  est constant.

**Exercice 2.** Soit  $A$  un anneau commutatif unitaire, qui contient exactement  $n > 0$  diviseurs de 0 non nuls. Montrer que  $A$  a au plus  $(n + 1)^2$  éléments. Donner un exemple où il y a égalité.

**Exercice 3.** 1. Soit  $A$  un anneau euclidien (qui n'est pas un corps). Montrer qu'il existe un  $x \in A$ , non nul et non inversible, tel que la projection canonique  $A \rightarrow A/(x)$  induise une surjection  $A^\times \cup \{0\} \rightarrow A/(x)$ .

2. Montrer que  $A/(x)$  est alors un corps.
3. On considère l'anneau  $\mathbb{Z}[\sqrt{N}]$ , pour un entier  $N < 0$  sans facteur carré. Déterminer  $\mathbb{Z}[\sqrt{N}]^\times$ .
4. Si  $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{N}] - \{0\}$ , calculer le cardinal de  $\mathbb{Z}[\sqrt{N}]/(x)$ .
5. En déduire que si  $N < -3$  alors l'anneau  $\mathbb{Z}[\sqrt{N}]$  n'est pas euclidien.
6. Qu'en est-il pour  $N = -1$  ? pour  $N = -2$  ?

**Exercice 4.** Soit  $A$  un anneau commutatif intègre. Soit  $I$  l'idéal de  $A[X, Y]$  engendré par  $X + Y$ .

1. Montrer que  $A[X, Y]/I$  est isomorphe à l'anneau  $A[X]$ .
2. L'idéal  $I$  est-il premier ? Est-il maximal ?

---

### Séries formelles

---

**Exercice 5.** Pour tous entiers  $n \geq 1$  et  $k \geq 0$  on définit

$$S(n, d) = \#\{(k_1, \dots, k_n) \in \mathbf{N} \mid k_1 + \dots + k_n = d\}.$$

1. Démontrer l'identité suivante, dans  $\mathbf{Q}[[T]]$  :

$$\sum_{d=0}^{\infty} S(n, d)T^d = \frac{1}{(1 - T)^n}.$$

2. En déduire que  $S(n, d) = \binom{n+d-1}{d}$ .

**Exercice 6.** On souhaite déterminer le nombre  $q_n$  de façons de regrouper les éléments  $a_1, a_2, \dots, a_n$  pour effectuer le produit non associatif de  $a_1, a_2, \dots$  et  $a_n$ .

Par exemple,  $q_1 = q_2 = 1$ . Pour  $n = 3$ , on peut avoir  $a_1 * (a_2 * a_3)$  ou  $(a_1 * a_2) * a_3$ . Donc  $q_3 = 2$ .

1. Montrer, par récurrence, que pour tout  $n \geq 2$ ,

$$q_n = \sum_{j=1}^{n-1} q_j q_{n-j}.$$

2. Soit  $f(X) = \sum_{j=1}^{\infty} q_j X^j \in \mathbf{C}[[X]]$ . Calculer  $f(X)^2$ .
3. En déduire  $f(X)$ , puis  $q_n$  pour tout  $n \geq 1$ .